



ADD VALUE

Enzo Pro

Papildomam tręšimui skirtos **mangano (Mn)** skystos trąšos, praturtintos **cinku (Zn)**, **variu (Cu)** ir **aminorūgštimi L-Proline**. Manganas įeina į daugelio fermentų sudėtį ir dalyvauja oksidacijos bei redukcijos reakcijose. Dėl mangano nitratinis azotas augaluose paverčiamas amoniaku, o kai kuriais atvejais amoniakinis azotas virsta nitratais. Varis dalyvauja baltymų ir angliavandenių apykaitoje, formuoja ligniną, kuris yra struktūrinis ląstelių stiprumo elementas, dėl to didėja atsparumas grybelinėms ir bakterinėms ligoms. Cinkas yra daugelio fermentų sudėtinė dalis bei dalyvauja įvairiuose energijos ir maistinių medžiagų apykaitos procesuose.

PRIVALUMAI:

- padidina augalų atsparumą patogenams,
- skatina šaknų sistemos vystymąsi,
- daro įtaką produktyvių stiebų formavimuisi ir jų stiprumui,
- skatina cukraus gamybą lapuose ir jo transportavimą į šaknis,
- gerina geležies pasisavinimą iš dirvožemio,
- sumažina chlorozės tikimybę.

PAKUOTĖ



SUDĖTIS

	Kiekis %	Kiekis g/l
Manganas (Mn)	9,2	140
Cinkas (Zn)	4,6	70
Azotas (N)	7,0	110
Nitratinis azotas (N-NO3)	7,0	110
Varis (Cu)	1,35	20
Aminorūgštis L-prolinas	0,34	12
pH (1:10 H2O)	1,5-2,5	
Tankis 20C, g/ml	1,52-1,55	



Tręšimo „Enzo Pro“ rekomendacijos:

Pasėliai	Dozavimas	Tręšimo būdas ir laikas
Javai	0,5-1,0 l/ha	Purškimai: I-BBCH 10-19, II-BBCH 21-35
Rapsai	0,5-1,0 l/ha	Purškimai: I-BBCH 10-18, II-BBCH 25-51
Ankštiniai augalai (pupos, soja)	0,5-1,0 l/ha	Purškimai: I-3-5 lapai; II-butonizacijos pradžia
Runkeliai	0,5-1,0 l/ha	Purškimas susiformavus 50% lapų
Kukurūzai	0,5-1,0 l/ha	Purškimai: I-2-4 lapai; II-4-6 lapai
Bulvės	0,25-0,5 l/100 l vandens	Purškimai: I-lapų ir stiebų augimas, II-gumbų formavimas, III-žydėjimas, IV-brendimas
Daržovės	0,25-0,5 l/100 l vandens / laistymas 0,2-0,5% tirpalu	Purškiama/laistoma butonizacijos, žydėjimo pradžioje arba šakniavaisio formavimo ir augimo tarpsniuose, 3-5 kartus, kas 7-10 dienų
Uogakrūmiai	0,25-0,5 l/100 l vandens / laistymas 0,2-0,5% tirpalu	Purškiama/laistoma uogų mezgimo ir derėjimo metu 4-6 kartus, kas 5-7 dienas
Sodo augalai	0,25-0,5 l/100 l vandens / laistymas 0,2-0,5% tirpalu	Purškiama/laistoma vaisių užuomazgų formavimo metu 1-2 kartus
Dekoratyviniai augalai ir daigai	0,25-0,5 l/100 l vandens / laistymas 0,2-0,5% tirpalu	Purkšti/laistyti rudenį, kad augalai geriau peržiemotų ir žydėjimo metu, kas 7-10 dienų
		*0,2-0,5% tirpalas (200-500 ml / 100 l vandens)



SUDERINAMUMAS

„Enzo Pro“ galima naudoti mišiniuose su daugeliu trąšų ir pesticidų (insekticidų, fungicidų). Nenaudokite su produktais, kuriuose yra daug vario (Cu), sieros (S), mineralinių alyvų bei su šarminiais produktais (pH > 8), su herbicidais ir beicu, kurių etiketėje parašyta „nemaišyti su trąšomis“. Prieš maišant rekomenduojama paruošti nedidelį mišinio kiekį siekiant patikrinti, ar nėra nuosėdų. Norint patikrinti, ar augalams nesukelia fitotoksinio poveikio, rekomenduojama purkšti nedideliame plote.

