



ADD VALUE

Enzo

Papildomam tręšimui skirtos **mangano (Mn)** skystos trąšos, praturtintos **cinku (Zn)** ir **aminorūgštimi L-Proline**. Manganas skatina šaknų sistemos vystymąsi, naujų ūglių formavimąsi, cukraus gamybą lapuose ir transportavimą į šaknis, gerina geležies pasisavinimą iš dirvožemio ir mažina chlorozės tikimybę. Cinkas labai svarbus pradžioje vegetacijos – jis įtakoja produktyvių stiebų formavimąsi, jų tvirtumą ir grūdų formavimąsi. L-proolino aminorūgštis svarbi daugiau nei dešimtyje augalų augimo ir vystymosi procesų, tokių kaip osmosinio slėgio reguliavimas, žiotelių reguliavimas, sėklų brinkinimas, žiedadulkių brendimo skatinimas, fotosintezės skatinimas bei chlorofilo susidarymo reguliavimas.

PRIVALUMAI:

- padidina augalų atsparumą patogenams,
- skatina šaknų sistemos vystymąsi,
- skatina cukraus gamybą lapuose ir jo transportavimą į šaknis,
- sumažina chlorozės tikimybę,
- pagerina nitratinio azoto pavertimą amoniaku, o kai kuriais atvejais amoniakinio azoto oksidaciją į nitratų.

PAKUOTĖ



SUDĖTIS

	Kiekis %	Kiekis g/l
Manganas (Mn)	13,0	200
Cinkas (Zn)	0,8	12,5
Azotas (N)	7,4	115
Nitratinis azotas (N-NO3)	7,4	115
Aminorūgštis L-prolinas	0,33	5
pH (1:10 H2O)	2,0-3,0	
Tankis 20C, g/ml	1,56-1,6	



Tręšimo „Enzo“ rekomendacijos:

Pasėliai	Dozavimas	Tręšimo būdas ir laikas
Javai	0,5-1,0 l/ha	Purškimai: I-BBCH 10-19, II-BBCH 21-35
Rapsai	0,5-1,0 l/ha	Purškimai: I-BBCH 10-18, II-BBCH 25-51
Ankštiniai augalai (pupos, žirniai, soja)	0,5-1,0 l/ha	Purškimai: I-3-5 lapai; II-butonizacijos pradžia
Runkeliai	0,5-1,0 l/ha	Purškimas susiformavus 50% lapų
Kukurūzai	0,5-1,0 l/ha	Purškimai: I-2-4 lapai; II-4-6 lapai
Bulvės	0,25-0,5 l/100 l vandens	Purškimai: I-lapų ir stiebų augimas, II-gumbų formavimas, III-žydėjimas, IV-brendimas
Daržovės	0,25-0,5 l/100 l vandens / laistymas 0,2-0,5% tirpalu	Purškiama/laistoma butonizacijos, žydėjimo pradžioje arba šakniavaisio formavimo ir augimo tarpsniuose, 3-5 kartus, kas 7-10 dienų
Uogakrūmiai	0,25-0,5 l/100 l vandens / laistymas 0,2-0,5% tirpalu	Purškiama/laistoma uogų mezgimo ir derėjimo metu 4-6 kartus, kas 5-7 dienas
Sodo augalai	0,25-0,5 l/100 l vandens / laistymas 0,2-0,5% tirpalu	Purškiama/laistoma vaisių užuomazgų formavimo metu 1-2 kartus
Dekoratyviniai augalai ir daigai	0,25-0,5 l/100 l vandens / laistymas 0,2-0,5% tirpalu	Purkšti/laistyti rudenį, kad augalai geriau peržiemotų ir žydėjimo metu, kas 7-10 dienų
		*0,2-0,5% tirpalas (200-500 ml / 100 l vandens)



SUDERINAMUMAS

„Enzo“ galima naudoti mišiniuose su daugeliu trąšų ir pesticidų (insekticidų, fungicidų). Nenaudokite su produktais, kuriuose yra daug vario (Cu), sieros (S), mineralinių alyvų bei su šarminiais produktais (pH > 8), su herbicidais ir beicu, kurių etiketėje parašyta „nemaišyti su trąšomis“. Prieš maišant rekomenduojama paruošti nedidelį mišinio kiekį siekiant patikrinti, ar nėra nuosėdų. Norint patikrinti, ar augalams nesukelia fitotoksinio poveikio, rekomenduojama purkšti nedideliame plote.

