



ADD VALUE

Kalisto

Skystos, koncentruotos trąšos, praturtintos kaliu (K), skirtos papildomam tręsimui. Kalis yra viena iš svarbiausių maistinių medžiagų, aktyviai dalyvaujančių daugelyje procesų, turinčių įtakos augalo augimui ir dauginimuisi. „Kalisto“ palaiko ląstelių osmosinį slėgį ir vandens balansą, kontroliuoja žiotelių funkciją lapuose. Kalis trąšose yra grynas, be jokių priedų (N, S, P) ir tai leidžia išvengti nepageidaujamo maistinių medžiagų nesuderinamumo.

PRIVALUMAI:

- skatina šaknų mitybos efektyvumą,
- skatina naujų ūglių susidarymą,
- aktyvina maistinių medžiagų apykaitą augalų sultyse,
- augalai geriau išlaiko drėgmę,
- augalai tampa atsparesni sausroms, aukštai ir žemai temperatūrai,
- stabdo daugelio ligų plitimą ir kenkėjų daromą žalą,
- gerina kokybės parametrus, skatina gausesnę derėjimą (padidina sėklų ir vaisių svorį) bei tolygų nokimą,
- pagerina vaisių organoleptines savybes, prekinę išvaizdą, daro įtaką ilgesniam ir geresniam produkto išsilaikymui sandėliuojant.

PAKUOTĖ



SUDĒTIS

	Kiekis %	Kiekis g/l
Kalio oksidas (K O)	34,0	500
Aminorūgštis L-prolinas	0,34	5
pH (1:10 H ₂ O)	11,0-12,0	
Tankis 20C, g/ml	1,5-1,52	



Tręšimo „Kalisto“ rekomendacijos:

Augalai	Tręšimo norma	Tręšimo būdas ir laikas
Javai, rapsai, ankštiniai augalai (pupos, žirniai, soja), burokėliai, kukurūzai	0,5-1,0 l/ha	Purškimai: tinka tręšti antroje vegetacijos pusėje, nuo užuomazgų formavimo pradžios iki brendimo vidurio
Bulvės	0,25-0,5 l/100 l vandens	Purškimai: I-lapų ir stiebų augimas, II-gumbų formavimas, III-žydėjimas, IV-brendimas
Daržovės	0,25-0,5 l/100 l vandens / laistymas 0,2-0,5%	Purškiama/laistoma butonizacijos, žydėjimo pradžioje arba šakniavaisio formavimo ir augimo tarpsniuose, 3-5 kartus, kas 7-10 dienų
Uogakrūmiai	0,25-0,5 l/100 l vandens / laistymas 0,2-0,5%	Purškiama/laistoma uogų mezgimo ir derėjimo metu 4-6 kartus, kas 5-7 dienas
Sodo augalai	0,25-0,5 l/100 l vandens / laistymas 0,2-0,5%	Purškiama/laistoma vaisių užuomazgų formavimo metu 1-2 kartus
Dekoratyviniai augalai ir daigai	0,25-0,5 l/100 l vandens / laistymas 0,2-0,5%	Purkšti/laistyti rudenį, kad augalai geriau peržiemotų ir žydėjimo metu kas 7-10 dienų
		*0,2-0,5% tirpalas (200-500 ml / 100 l vandens)



SUDERINAMUMAS

„Kalisto“ galima naudoti mišiniuose su daugeliu trąšų ir pesticidų (insekticidų, fungicidų). Nenaudokite su produktais, kuriuose yra daug vario (Cu), sieros (S), mineralinių alyvų bei su šarminiais produktais ($\text{pH} > 8$), su herbicidais ir beicu, kurių etiketėje parašyta „nemaišyti su trąšomis“. Prieš maišant rekomenduojama paruošti nedidelį mišinio kiekį siekiant patikrinti, ar nėra nuosėdų. Norint patikrinti, ar augalams nesukelia fitotoksinio poveikio, rekomenduojama purkšti nedideliame plote.

