

ADD VALUE

Zinto

„Zinto“ yra skystos koncentruotos cinko trąšos, skirtos fiziologiniams procesams ir fosforo pasisavinimui ankstyvosiose vystymosi stadijose stimuliuoti. Cinkas svarbus chlorofilo, karbohidratų, auksinų bei krakmolo sintezėje, atsakingas už pigmentų, lapus dengiančios kutikulės formavimąsi. Cinkas kaip elementas gerai juda tiek augalo viduje, tiek dirvožemyje. Cinko pasisavinimas pasunkėja esant aukštam dirvožemio pH (pH > 7,5). Esant cinko trūkumui augalai silpnai vystosi, javai blogai krūmijasi, kukurūzai auga maži, ankštiniai mažai dera. Cinkas reikalingas visiems augalams, bet ypatingai cinko trūkumui jautrūs žieminiai kviečiai, salykliniai miežiai, žirniai, pupos, kukurūzai, ankštiniai augalai.

PRIVALUMAI:

- gerina daigumą,
- gerina fosforo pasisavinimą,
- skatina šaknų sistemos vystymąsi,
- skatina generatyvinių organų susiformavimą,
- skatina žydėjimo intensyvumą.

PAKUOTĖ

1l 1l 5l 5l 10l 10l 10l 10l 1000l

SUDĖTIS

	Kiekis %	Kiekis g/l
Cinkas (Zn)	13,0	200
Manganas (Mn)	1,35	20
Azotas (N)	6,6	100
Nitratinis azotas (N-NO3)	6,6	100
Varis (Cu)	0,13	2
Oligochitozanas	0,13	2
pH (1:10 H2O)	1,0-3,0	
Tankis 20C, g/ml	1,54-1,6	

Trešimo „Zinto“ rekomendacijos:

Pasėliai	Dozavimas	Trešimo būdas ir laikas
Javai	0,5-1,0 l/ha	Purškimai: I-BBCH 10-19, II-BBCH 21-35
Rapsai, ankštiniai augalai, runkeliai, kukurūzai	0,5-1,0 l/ha	Purškimai-tinka trešti visus augalus, kai trūksta cinko
Bulvės	0,25-0,5 l/100 l vandens	Purškimai: I-lapų ir stiebų augimas, II-gumbų formavimas, III-žydėjimas, IV-brendimas
Daržovės	0,25-0,5 l/100 l vandens / laistymas 0,2-0,5% tirpalu	Purškiama/laistoma butonizacijos, žydėjimo pradžioje arba šakniavaisio formavimo ir augimo tarpsniuose, 3-5 kartus, kas 7-10 dienų
Uogakrūmiai	0,25-0,5 l/100 l vandens / laistymas 0,2-0,5% tirpalu	Purškiama/laistoma uogų mezgimo ir derėjimo metu 4-6 kartus, kas 5-7 dienas
Sodo augalai	0,25-0,5 l/100 l vandens / laistymas 0,2-0,5% tirpalu	Purškiama/laistoma vaisių užuomazgų formavimo metu 1-2 kartus
Dekoratyviniai augalai ir daigai	0,25-0,5 l/100 l vandens / laistymas 0,2-0,5% tirpalu	Purkšti/laistyti rudenį, kad augalai geriau peržiemotų ir žydėjimo metu, kas 7-10 dienų
		*0,2-0,5% tirpalas (200-500 ml / 100 l vandens)

SUDERINAMUMAS

„Zinto“ galima naudoti mišiniuose su daugeliu trąšų ir pesticidų (insekticidų, fungicidų). Nenaudokite su produktais, kuriuose yra daug vario (Cu), sieros (S), mineralinių alyvų bei su šarminiais produktais (pH > 8), su herbicidais ir beicu, kurių etiketėje parašyta „nemaišyti su trąšomis“. Prieš maišant rekomenduojama paruošti nedidelį mišinio kiekį siekiant patikrinti, ar nėra nuosėdų. Norint patikrinti, ar augalams nesukelia fitotoksinio poveikio, rekomenduojama purkšti nedideliame plote.